Vortrag, Wendepunkt
vom 19.11.24

Autismusspektrumkrankheit (ASS)

- Bei der Begriff autistisch Autismus Asperger beschreibt zurückgezogenes Sozialverhalten mit abgebrochener Kommunikation bei der Schizophrenie pat.
- GWAS Schizo Depr. Bipol. St., Autismus ADHS gleiche veränderte Genloki
- ASS Hypersensibilität, ADS haben alle den gleichen veränderten Genlokus, bei ASS kommen hemmig und Sprachentwicklungsprob. dazu i. Agnosie Sympt: hyperventil, hyperaktiv, Wahrnehmungsstörung
- Rolle des Genfeldes: hyperaktives Genfeld verändert (kann scheue Menschen mit ADS ins Rampenlicht drängen bis hin zu Kommunikationsverweigerung.
- ASS wird leicht verwechselt als Angststörung, Warum?
- Hyperaktive, stofforientierte, extrovertierte Welt kennt wenig bis keinen Platz für scheue Menschen, die mehr Zeit brauchen, um über alles sorgfältig nachzudenken.

https://adhs.expert

Company with ASS

- teilnehmende Beobachtung wie in der Forschung von tierischen Sozialverhalten Jane Goodall, Frans de Waal, Dian Fossey
- Markieo Methode: Gegenüber fortlaufend validieren & nachfragen, ob man es richtig verstanden hat
- sich selbst einbringen ohne von anderen etw. zu wollen od. beeinflussen zu wollen
- ev. über andere Kommunikationsmittel gehen wie Musik und Interesse fragen & dann indirekt herausfinden, dass die andere Person interessiert
- Selbst stets im low arousal Status der einmal aufgeregt war
- Zu Aktivitäten Gitter ohne Befehl, etc. gemeinsam machen
- Selbst authentisch sein

https://adhs.expert

Reinschrift der Handschrift
Unsichere Lesungen sind mit [?] markiert.

[Handschrift Seite 1]
Weiterbildung Wendepunkt vom 19.11.24

Autismusspektrumkrankheit (ASS)
– Erst [?] der Begriff autistisch, Autismus, Asperger beschreibt zurückgezogenes Sozialverhalten mit abgebrochener Kommunikation, beschrieben bei Schizophreniepat.
– GWAS: Schizo., Depr., bipol. St., Autismus, ADHS: gleiche veränderte Genloken
– ASS, Hypersensibilität, ADS haben alle den gleichen veränderten Genlokus, bei ASS kommen häufig noch Spracherwerbsprobl. dazu u. Agnosie. Sympt.: hypersensibel, hyperreaktiv, klare Struktur
– Rolle des Umfeldes: hyperaktives Umfeld, sehr kommunikativ [?], kann scheue Menschen mit ASS ins Rückzugsverhalten drängen bis hin zur Kommunikationsverweigerung.
– ASS wird heute vermehrt als Diagn. gestellt, warum?
– Hyperaktive, erfolgsorientierte, extravertierte Welt lässt wenig bis keinen Platz für scheue Menschen, die mehr Zeit brauchen, um über alles sorgfältig nachzudenken.

[Handschrift Seite 2]
Umgang mit ASS
– Teilnehmende Beobachtung wie in der Forschung von tierischem Sozialverhalten: Jane Goodall, Frans de Waal, Dian Fossey
– Marte Meo Methode: Gegenüber fortlaufend validieren u. nachfragen, ob man es richtig verstanden hat
– sich selbst einbringen, ohne vom andern etw. zu wollen od. beeinflussen zu wollen
– ev. über andere Kommunikationsmittel gehen wie Musik, nach Interessen fragen u. dann indirekt herausfinden, was die andere Person interessiert
– Selbst stets im «low arousal»-Status sein, niemals aufgeregt sein
– Zur Mithilfe bitten ohne Befehl, etw. gemeinsam machen
– selbst authentisch sein

https://adhs.expert